

ОРВИ

Родители будьте очень внимательны к
заболевшим детям и своевременно
обращайтесь за медицинской помощью

Изменение сознания

Ребенок слишком сонлив, его не удается растормошить, не реагирует на вопросы – следует незамедлительно вызвать скорую помощь

Температура

Если жаропонижающие средства не снижают t ниже 39.5°C при условии, что дана необходимая доза препарата, у ребенка нет обезвоживания, он не укутан и находится в комнате с нормальной температурой воздуха (не более 23°C)

Высыпания

Если дополнительно к высокой температуре тела у ребенка появляются различные высыпания на коже, необходимо записаться на прием к врачу (не экстренно). НО!

Геморрагическая сыпь требует экстренного осмотра специалиста (при надавливании прозрачным стеклянным стаканом или прозрачной линейкой сыпь не бледнеет)

Жидкость

Если малыш отказывается от воды и любой другой жидкости, у него сухой язык, бледная и холодная кожа, маленький объем выделяемой мочи или редкое мочеиспускание (реже 1 раза за 6 часов) требуется обязательный осмотр доктором в течение суток

Дыхание

Если у ребенка появилась одышка, учащенное дыхание (более 40 в минуту у детей старшего возраста и более 50 у грудных детей), затруднение вдоха или выдоха, боль в грудной клетке – вызвать скорую помощь

Продолжительность

Если температура плохо снижается и сохраняется более 3 дней или температура вновь повысилась после нескольких дней ее нормальных значений, следует показать ребенка врачу



Младенцы

Если у маленького ребенка младше 3 месяцев температура тела выше 38°C необходимо в течение суток показать его специалисту

**Если родители
чувствуют, что с
ребенком что-то не
так, не нужно
медлить. Необходимо
звонить и показывать
малыша доктору, ведь
мама и папа, как
никто другой, знают
свою кроху**